

# Эпидемиология, патогенез и лечение кандидоза мочеполовых органов у женщин

**Р.Ф. Айзятулов, Э.М. Айзятурова**

Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман

---

**Цель исследования:** обзор и анализ тематических публикаций, посвященных изучению эпидемиологии, патогенеза кандидоза мочеполовых органов у женщин; повышение эффективности комплексной терапии урогенитального кандидоза у женщин с применением антимикотических препаратов общего и местного действия.

**Материалы и методы.** Выполнено клинико-лабораторное обследование 23 женщин с кандидозом мочеполовых органов в возрасте от 21 года до 45 лет. Изучали анамнестические данные и проводили лабораторные методы исследования. Клиническая диагностика основывалась на выявлении совокупности признаков заболевания, которые включали в себя рецидивирующую боль в области придатков, нарушение менструальной функции, выделения из влагалища, периодические обострения заболевания.

**Результаты.** На основании данных литературы, собственных клинических наблюдений был проведен анализ эпидемиологии и некоторых аспектов патогенеза, описаны клинические формы заболевания. У пациентов наблюдались кандидозный вульвовагинит, кандидозный эндоцервицит и кандидозный уретрит. Для кандидозных поражений женских половых органов характерными клиническими проявлениями были небольшого размера, резко ограниченные, округлые, серо-белые налеты, которые содержали большое количество грибов *Candida*. В острой стадии налеты были плотные и снимались с трудом, а в дальнейшем легко. Слизистая оболочка в очагах поражения имела склонность к кровоточивости, а вокруг налета была гиперемирована. Ввиду частоты случаев безуспешности терапии и рецидивов заболевания важной проблемой остаются вопросы лечения кандидоза мочеполовых органов у женщин, что указывает на необходимость поиска новых методов терапии.

**Заключение.** Согласно материалам многочисленных публикаций, актуальной современной проблемой является рост заболеваемости кандидозом мочеполовых органов у женщин с хроническим течением заболевания и резистентностью к лечению. Предложенная комплексная терапия кандидоза мочеполовых органов у женщин, включающая системные антимикотики (Фуцис, Эсзол) и противогрибковые препараты местного действия (суппозитории Клофан, Фуцис Гель®) способствует излечению пациенток и предотвращает рецидивы заболевания.

**Ключевые слова:** кандидоз мочеполовых органов, женщины, эпидемиология, патогенез, клиника, лечение.

## Epidemiology, pathogenesis and treatment of urogenital candidiasis in women

**R. Aiziatulov, E. Aiziatulova**

**The objective:** to review and analyze thematic publications on the study of epidemiology, pathogenesis of urogenital candidiasis in women. To increase the effectiveness of complex therapy of urogenital candidiasis in women with the use of anti-mycotic drugs of general and local action.

**Materials and methods.** A clinical and laboratory examination of 23 women with urogenital candidiasis aged 21 to 45 years was conducted. Anamnestic data were studied and laboratory research methods were performed. Clinical diagnosis was based on identifying the totality of signs of the disease, which included recurrent pain in the area of the appendages, menstrual dysfunction, vaginal discharge, periodic exacerbations of the disease.

**Results.** Patients diagnosed with urogenital candidiasis and candidates are subject to mandatory therapy as potential sources of infection and autoinfection of the urogenital organs. It is necessary to treat sexual partners in a timely manner. An important medical problem is the improvement of treatment methods. It is necessary to pay special attention to urogenital candidal infection in view of the development of severe complications and the effect on the reproductive function of women.

**Conclusions.** Comprehensive treatment of candidal infections of the urogenital tract in women using systemic antifungal drugs (Futsis, Eszol) and local drugs (Clofan suppositories) is effective, does not cause side effects, and can be widely used by practitioners in practical health care, which will help reduce the number of relapses and more quickly recovery of patients.

**Key words:** urogenital candidiasis, women, etiopathogenesis, clinic, treatment.

## Епідеміологія, патогенез і лікування кандидозу сечостатевих органів у жінок

**Р.Ф. Айзятулов, Е.М. Айзятурова**

**Мета дослідження:** огляд і аналіз тематичних публікацій, присвячених вивченню епідеміології, патогенезу кандидозу сечостатевих органів у жінок; підвищення ефективності комплексної терапії урогенітального кандидозу у жінок із застосуванням антимікотичних препаратів загальної та місцевої дії.

**Матеріали та методи.** Виконано клініко-лабораторне обстеження 23 жінок з кандидозом сечостатевих органів у віці від 21 до 45 років. Вивчали анамнестичні дані і проводили лабораторні методи дослідження. Клінічна діагностика ґрунтувалася на виявленні сукупності ознак захворювання, які включали в себе рецидивний біль у ділянці придатків, порушення менструальної функції, виділення з піхви, періодичні загострення захворювання.

**Результати.** На підставі даних літератури, власних клінічних спостережень було проведено аналіз епідеміології та деяких аспектів патогенезу, описані клінічні форми захворювання. У пацієнтів спостерігалися кандидозний вульвовагініт, кандидозний ендоцервіцит і кандидозний уретрит. Для кандидозних уражень жіночих статевих органів характерними клінічними проявами були невеликого розміру, різко відмежовані, округлі, сіро-блілі нальоти, які містили велику кількість грибів *Candida*. У гострій стадії нальоти були щільні і знімалися важко, а в подальшому легко. Слизова оболонка у вогнищах ураження мала схильність до кровоточивості, а навколо нальоту

була гіперемована. Через частоту випадків безуспішності терапії і рецидивів захворювання важливою проблемою залишаються питання лікування кандидозу сечостатевих органів у жінок, що свідчить про необхідність пошуку нових методів терапії.

**Заключення.** Згідно з матеріалами численних публікацій, актуальною сучасною проблемою є зростання захворюваності на кандидоз сечостатевих органів у жінок з хронічним перебігом захворювання і резистентністю до лікування. Запропонована комплексна терапія кандидозу сечостатевих органів у жінок, що включає системні антимікотики (Фуцис, Есозол) і протигрибкові препарати місцевої дії (супозиторії Клофан, Фуцис Гель®), сприяє лікуванню пацієнток і запобігає рецидивам захворювання.

**Ключові слова:** кандидоз сечостатевих органів, жінки, епідеміологія, патогенез, клініка, лікування.

**К**андидоз являється болезнью современной цивилизации и наиболее часто встречающимся воспалительным заболеванием мочеполовых органов у женщин, которое занимает все больший удельный вес в структуре гинекологической патологии как по количеству случаев, так и по числу рецидивов [2, 8, 11, 15, 16].

В настоящее время большое внимание многих врачей обращено к урогенитальному кандидозу у женщин, что обусловлено эпидемиологическими предпосылками. Передача инфекции от матери детям в процессе родоразрешения, возможность инфицирования половых партнеров, диссеминация инфекции из влагалища в другие органы (кандидоурия, ануисты, глосситы, поражение складок кожи, половых органов и ягодиц у новорожденных) [3, 8, 10, 11, 12, 13]. Описаны вспышки кандидоза у новорожденных в родильных домах, заражение плода при прохождении через инфицированные родовые пути матери, о чем свидетельствуют высокая частота выделения грибов Candida у новорожденных и совпадение вида у новорожденного и его матери, преимущественное выделение этих грибов с кожи новорожденного [12, 13, 15, 16]. Заражение ребенка может произойти также при кандидозе сосков матери, наличии у нее кандидоза половых органов, он может заразиться также от персонала через предметы ухода и др. [8, 12, 13, 15]. Развитию урогенитального кандидоза у женщин способствует ношение белья из синтетической ткани, плотно облегающей тело, в результате чего создается микроклимат с повышенной местной температурой и влажностью, происходит мацерация рогового слоя, возникают термостатные условия для развития местной микрофлоры, в том числе и кишечной, где среди дрожжевых грибов наиболее частый возбудитель кандидоза половых органов Candida albicans составляет более 95% [1, 4, 12, 14, 15, 16].

Получены данные проведенных клинико-лабораторных обследований супружеских пар и половых партнеров, которые подтверждают достоверность полового пути передачи кандидозной инфекции при диагностировании кандидозных уретритов у мужчин, хотя у них они встречаются гораздо реже, чем кандидозные поражения половых органов у женщин. Однако при проведении конфронтации у половых партнеров больных мужчин с уретритами выявляют кандидозный вульвовагинит, причем оба партнера заражаются одними и теми же штаммами гриба Candida. Ряд авторов считают, что грибы Candida инфицируют сперму мужей женщин, больных кандидозом, и в связи с этим во избежание реинфекциии предлагают проводить одновременно противокандидозное лечение мужчин. Более того, они предполагают, что кандидоз может быть причиной бесплодия из-за неблагоприятного влияния грибов Candida на жизнеспособность и подвижность сперматозоидов.

По данным ВОЗ, более 20 млн женщин земного шара употребляют пероральные контрацептивы, а у 67,7% женщин, принимающих пероральные контрацептивы или имеющие внутриматочные спирали, грибы Candida albicans были выделены из влагалища, причем у большинства наблюдались клинические проявления кандидоза. Следует отметить, что гормональные оральные контрацептивы вызывают торможение овуляции, вследствие чего развиваются те же изменения, что и при беременности; нередко

возникают гормональные расстройства, так как эта группа препаратов воздействует на обменные процессы в организме, способствует фиксации гликогена промежуточными клетками, изменяет бактериальную флору влагалища и рН [8, 12, 15]. При введении внутриматочной спирали развивается аспептическое реактивное воспаление на инородное тело в полости матки и в первые дни может осложниться инфицированием грибами Candida, которые до этого момента вегетировали во влагалище в небольшом количестве и не вызывали симптомов кандидоза, а попадая в полость матки на воспаленный субстрат, они приобретают патогенность, поддерживая впоследствии хронический эндоцервicit и вагинит [8, 10, 15].

Грибы рода Candida попадают в половые органы различными путями, но основным источником заражения, по мнению многих авторов, является пищеварительный тракт, то есть происходит аутоинфицирование. Заражению способствует также наличие кандидозных онихий, паронихий и межпальцевых поражений [1, 3, 12, 15]. Медицинский персонал может заразиться при непосредственном контакте с больными или через окружающие предметы и приборы и, в свою очередь, быть источником инфицирования больных, что указывает на необходимость проведения в данных учреждениях профилактических дезинфекционных мероприятий [3, 4, 12, 15]. Развитию кандидоза способствуют экзогенные и эндогенные факторы [2, 4, 5, 7, 13, 15, 16, 17]. К экзогенным факторам относятся:

- травмы (механическая и химическая);
- механическая травма и микротравма наружных половых органов;
- потертости при несоблюдении правил личной гигиены;
- ношение синтетических туго прилегающих иочных пижам, способствующих прилипанию возбудителя (нарушается целостность кожи и создаются «входные ворота» для попадания грибов Candida извне или своих собственных, сaproфитирующих на коже и слизистых оболочках).

Химическая травма создает не только «входные ворота» для инфекции, но и нарушает защитную мантию кожи, изменяет рН в сторону ощелачивания (профессиональные онихии, паронихии, межпальцевые опрелости, вульвиты, вагиниты у работниц, занятых в производстве антибиотиков и кондитерских изделий). Загрязнение воздуха продуктами синтеза антибиотиков, сахарной пудрой, попадающими на одежду и нижнее белье работниц, которые из-за высокой температуры в этих цехах носят только нижнее белье и халаты, способствует высокой заболеваемости урогенитальным кандидозом этого контингента женщин. Повышенная влажность и температура приводят к мацерации кожи (складки пахово-бедренные, перианальные, наружных половых органов), что подтверждается более высокой заболеваемостью у женщин в странах с жарким и влажным климатом по сравнению с другими климатическими зонами.

Существенную роль играют также антибиотикотерапия, применение гормональных лечебных стероидов, цитостатиков, побочное действие оральных контрацептивов, иммунодепрессантов, лучевой терапии, вирулентность и

патогенность штаммов дрожжеподобного гриба. К эндогенным факторам относят:

- детский и старческий возраст;
- нарушение обмена веществ, в первую очередь углеводного, а также белкового и жирового;
- эндокринные заболевания (сахарный диабет, дисменорея, гипотиреоидизм, гипо- и гиперкортицизм, гипофункция яичников);
- гиповитаминозы (недостаток рибофлавина – витамина В<sub>2</sub>, пиридоксина – витамина В<sub>6</sub>, никотиновой кислоты, аскорбиновой кислоты);
- общие тяжелые заболевания – острые и хронические, инфекционные и неинфекционные, которые ослабляют защитные силы организма;
- заболевания пищеварительного тракта – дисбактериоз, ахиля, холециститы, нарушение микробных ассоциаций в кишечнике и желчном пузыре (усиленно размножаются грибы *Candida*, которые обуславливают кишечное кандидоносительство и отсюда – возможность инфицирования мочеполовых органов);
- беременность;
- различные заболевания женских половых органов (аднекситы, вагиниты, эндоцервициты, лейкоплакия, крауэрз, нарушение функции яичников, неопластические заболевания).

Приведенные выше данные свидетельствуют о многосторонности патогенеза кандидоза мочеполовых органов у женщин. До настоящего времени лечение проблематично и недостаточно эффективно, что свидетельствует о целесообразности поиска патогенетически обоснованных методов терапии [5, 6, 7, 9, 18].

**Цель исследования:** обзор и анализ тематических публикаций, посвященных изучению эпидемиологии, патогенеза кандидоза мочеполовых органов у женщин; повышение эффективности комплексной терапии урогенитального кандидоза у женщин с применением антимикотических препаратов общего и местного действия.

### **МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ**

Было выполнено клинико-лабораторное обследование 23 женщин с кандидозом мочеполовых органов в возрасте от 21 года до 45 лет, а также изучены анамнестические данные. Проведены лабораторные методы исследования. Забор материала осуществляли из мочеиспускательного канала, канала шейки матки и заднего свода влагалища для бактериоскопического и бактериологического исследования. Клиническая диагностика основывалась на выявлении совокупности признаков заболевания, которые включали в себя рецидивирующую боль в области придатков, нарушение менструальной функции, выделения из влагалища, периодические обострения заболевания, малую эффективность обычно применяемой в гинекологии терапии для лечения воспалительных процессов половых органов.

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ**

На основании данных литературы, собственных клинических наблюдений был проведен анализ эпидемиологии и некоторых аспектов патогенеза, описаны клинические

формы заболевания. У пациентов были диагностированы кандидозный вульвовагинит, кандидозный эндоцервицит и кандидозный уретрит. Согласно нашим наблюдениям, для кандидозных поражений женских половых органов характерными клиническими проявлениями были небольшого размера, резко ограниченные, с округлыми очертаниями серо-белого цвета налеты, нередко сливающиеся, которые содержали большое количество грибов *Candida*. В острой стадии налеты плотные и снимаются с трудом, а в дальнейшем легко. Слизистая оболочка в очагах поражения имела выраженную склонность к кровоточивости, а вокруг налета была интенсивно гиперемирована. Выделяют острый урогенитальный кандидоз – до 4 эпизодов в год и хронический (рецидивирующий) урогенитальный кандидоз – более 4 эпизодов в год.

Ввиду частоты случаев безуспешности терапии и рецидивов заболевания важной проблемой остаются вопросы лечения кандидоза мочеполовых органов у женщин, что указывает на необходимость поиска новых методов терапии [5, 9, 18]. Необходимо своевременно лечить половых партнеров, чтобы исключить повторное заражение.

В комплексной терапии урогенитального кандидоза у женщин применяли системный антимикотик Фуцис (флуконазол), который назначали по 400 мг 1 раз в сутки (1–2-й дни лечения), и затем – по 200 мг 1 раз в сутки (3–10-й дни лечения). Фуцис обладает широким спектром противогрибкового действия против грибов рода *Candida* и «классических» диморфных возбудителей.

Были применены суппозитории вагинальные Клофан (1 суппозиторий содержит клотrimазола 100 мг) – вводили глубоко во влагалище по 1 суппозиторию на ночь в течение 10 дней. Клофан обладает фунгицидной и фунгистатической активностью, бактерицидным действием на грамположительные *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Gardnerella vaginalis* и грамотрицательные микроорганизмы.

При кандидозных поражениях кожи и слизистых оболочек назначали Фуцис® Гель (флуконазол 0,5%), который наносили на пораженные участки кожи и слизистых оболочек 1 раз в сутки в течение 10 дней.

При наличии флуконазолрезистентного вагинального кандидоза применяли системный антимикотик Эсзол (итраконазол) – внутрь по 1 капсуле (100 мг) 1 раз в день, курс – 10 дней. Эсзол обладает фунгицидным эффектом в отношении дерматофитов, дрожжевых грибов *Candida* spp. (включая *Candida albicans*). Одновременно назначали суппозитории вагинальные Клофан – вводили глубоко во влагалище по 1 суппозиторию на ночь в течение 10 дней.

### **ВЫВОДЫ**

Согласно материалам многочисленных публикаций, актуальной современной проблемой является рост заболеваемости женщин кандидозом мочеполовых органов с хроническим течением и резистентностью к лечению. Предложенная комплексная терапия кандидоза мочеполовых органов у женщин, включающая системные антимикотики (Фуцис, Эсзол) и противогрибковые препараты местного действия (суппозитории Клофан, Фуцис® Гель), способствует излечению пациенток и предотвращает рецидивы заболевания.

### **Сведения об авторах**

**Айзятулов Рушан Фатихович** – Донецкий национальный медицинский университет, 84404, г. Лиман, ул. Привокзальная, 27; тел.: (062) 385-95-00

**Айзятулова Эльмира Максутовна** – Донецкий национальный медицинский университет, 84404, г. Лиман, ул. Привокзальная, 27; тел.: (062) 385-95-00

### СПИСОК ЛІТЕРАТУРЫ

1. Айзятулов Р.Ф. Заболевания, передаваемые половым путем (этиология, клиника, диагностика, лечение): иллюстрированное руководство. – Донецк: Донеччина, 2000. – 384 с.
2. Айзятулов Р.Ф. Кандидозные поражения кожи и слизистых оболочек //Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2007. – № 5 (10). – С. 48–53.
3. Айзятулов Р.Ф. Сексуально-трансмиссивные заболевания (этиология, клиника, диагностика, лечение): иллюстрированное руководство. – Донецк: Каштан, 2004. – 400 с.
4. Айзятулов Ю.Ф. Стандарты диагностики и лечения в дерматовенерологии. – Донецк: Каштан, 2010. – 560 с.
5. Айзятулов Р.Ф., Айзятулова Д.Р. Современные аспекты этиопатогенеза, клиники и принципы лечения урогенитального кандидоза у жен-щин // Журнал дерматовенерології та косметології імені М.О. Торсуєва. – 2018. – № 1 (39). – С. 29–35.
6. Айзятулов Р.Ф., Коган Б.Г. Комплексне лікування хронічної урогенітальної інфекції у чоловіків і жінок: методичні рекомендації. – К., 2009. – 13 с.
7. Айзятулов Р.Ф., Коган Б.Г. Сучасні особливості етіології, патогенезу, клініки і лікування грибкових захворювань: методичні рекомендації). – К., 2010. – 12 с.
8. Діагностика та лікування інфекцій жіночих статевих органів: методичні рекомендації /Запорожан В.М. та ін. – К., 2004. – 32 с.
9. Дюдюон А.Д. Комплексно-диференційована терапія хворих з рецидивами урогенітальних інфекцій // Дерматовенерологія, косметологія, сексологія. – Дніпро, 2005. – № 1–2 (8). – С. 38–52.
10. Мавров Г.И., Никитенко И.Н. Условно-патогенная микрофлора в этиологии воспалительных заболеваний урогенитального тракта // Журнал дерматовенерологии и косметологии им. Н.А. Торсуева. – Донецк, 2002. – № 3–4. – С. 51–55.
11. Мавров Г.И., Унучко С.В., Бондаренко Г.М., Губенко Т.В., Никитенко И.Н., Щербакова Ю.В. Проблемные исследования в области венерологии // Дерматология та венерология. – Харків, 2004. – № 2 (24). – С. 67–72.
12. Дерматологія, венерологія: підручник /В.І. Степаненко та інш. – К.: КІМ, 2012. – 848 с.
13. Дитяча дерматовенерологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів дерматовенерологів / Л.Д. Калюжна та інш. – К.: Грамота, 2014. – 304 с.
14. Дудченко М.О., Васильєва К.В., Попова І.Б. Дерматовенерологія: на-вчальний посібник. – Полтава, 2011. – 319 с.
15. Клінічна мікологія: навчальний посібник для лікарів / Л.А. Болотна та інш. – Харків: ІПЦ «Контраст», 2004. – 96 с.
16. Кожные болезни и инфекции, передаваемые половым путем: учебное пособие /Ю.Ф. Айзятулов и др. – Донецк: Каштан, 2013. – 712 с.
17. Рай О.В., Туркевич С.А. Патогенетические механизмы кандидоза кожи при сахарном диабете // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2012. – № 1 (44). – С. 100–106.
18. Туркевич С.А., Рудник Т.І., Дащенко М.О. Досвід лікування поверхневого кандидозу у хворих на фоні пошкодження вуглєводневого обміну та цукрового діабету // Журнал дерматовенерології та косметології імені М.О. Торсуєва. – 2018. – № 2 (40). – С. 49–58.

Статья поступила в редакцию 02.07.2019